

Het verslag moet voortaan de berekening van het fractuurrisico (FRAX) omvatten.

Gelieve aan te duiden of de volgende risicofactoren aanwezig zijn :

0 Persoonlijke antecetenden van heupfracturen
(Vroegere fractuur op volwassenleeftijd spontaan opgetreden of fractuur door trauma die bij een volwassen gezonde persoon niet opgetreden zou zijn).

0 Antecedenten heupfracturen bij verwanten van de 1^{ste} graad (moeder of vader)

0 Actief roken

0 Glucocorticoïden gebruik
(Indien patiënt orale glucocorticoïden gebruikt of heeft gebruikt gedurende meer dan 3 maanden met dosis van 5 mg prednisolone per dag of meer (of gelijkwaardige dosis van andere glucocorticoïd).

0 Reumatoïde Artritis

0 Secondaire Osteoporose
(Indien patiënt pathologiën vertoont gekoppeld aan osteoporose. Met inbegrip Diabetis type 1 (insuline), osteogenesis imperfecta bij volwassene, niet behandelde langdurige hyperthyroidisme, hypogonadisme of vroegtijdige menopauze (<45 jaar), chronische ondervoeding, malabsorptie en chronische leverziekten.

0 Dagelijks gebruik van ≥ 3 eenheden alcohol

Botdensitometrie ZONDER terugbetaling door mutualiteit (55€ ten laste van de patiënt, en de patiënt is ervan op de hoogte gesteld).

In dit geval is de berekening van de FRAX geen verplichting wel een pluspunt. Indien u wenst dat de FRAX-score wordt berekend moeten de hierboven vermelde risicofactoren ingevuld worden.

Aanvragende Arts
(stempel + handtekening+ datum)